

ვირუსული ჰეპატიტების ზოგიერთი ფუნქციები					
	A	B	C	D	E
ვირუსი	რნმ	დნმ	რნმ	რნმ	რნმ
	27 5მ	42 5მ	30-60 5მ	36 5მ (HbsAg გარსთან ერთად	27 5მ
	Picornა	Hepadna	Flavi	----	Calici
გადაცემის გზები					
ფეკალური *	დიახ	არა	არა	არა	დიახ
სისხლი	იშვიათად	დიახ	დიახ	დიახ	არა
ვერტიკალური **	არა	დიახ	შემთხვევით(ზოგჯერ)	იშვიათად	არა
ნერწყვი	დიახ	დიახ	? არა	დიახ	?
სქესობრივი(სპერმა)	იშვიათად	დიახ	შემთხვევით(ზოგჯერ)	დიახ(ზოგჯერ)	არა
ინკუბაციური პერიოდი	მოკლე (2-3 კვირა)	ხანგრძლივი (1-5 თვე)	გარდამავალი	ხანგრძლივი	მოკლე
ასაკი	ახალგაზრდა	ნებისმიერი	ნებისმიერი	ნებისმიერი	ნებისმიერი
ღვიძლის ქრონიკული დაავადება	არ ვითარდება	ვითარდება	ვითარდება	ვითარდება	არ ვითარდება
ღვიძლის სიმსივნე	არ ვითარდება	ვითარდება	ვითარდება	იშვითად	არ ვითარდება
სიკვდილიანობა	< 0,5%	< 1%	< 1%		1-2%
იმუნიზაცია					
პასური	ნორმალური	B ჰეპატიტის	---	---	---
	იმუნოგლობულინი(0,04 -0,06 მლ/კგ)	იმუნოგლობულინი (HBIG)			
აქტიური	ვაქცინა	ვაქცინა	---	HBV ვაქცინა	---

* - იგივე განავალი. ** - გადაეცემა დედიდან შვილზე, მოცლადყოფნის პერიოდში